

※2005年10月改訂(第2版)
2005年2月作成

日本標準商品分類番号

879419

動物用医薬品

要指示医薬品

性腺刺激ホルモン放出ホルモン製剤
コンサルタン® 注射液
CONSULTAN® INJECTION

貯法：室温で保存してください。
使用期限：包装に表示の使用期限内に使用してください。

承認番号	16消安第6401号
販売開始	2005年3月

本剤は、酢酸フェルチレリンを有効成分とする筋肉内投与用注射液です。酢酸フェルチレリンは性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH) の類縁化合物で、下垂体前葉に作用して黄体形成ホルモン (LH) および卵胞刺激ホルモン (FSH) の放出を促します。

【組成・性状】

販売名	コンサルタン注射液
成分・含量	1 mL中酢酸フェルチレリン50 μ g (フェルチレリンとして47.5 μ g)
添加物	pH調整剤, 等張化剤
剤形・性状	バイアル (無色澄明な水性注射液)
pH	4.0~5.5
浸透圧比	0.8~1.2 (生理食塩液に対する比)

【効能・効果】

牛 (雌)：卵胞嚢腫, 排卵障害, 卵巢静止の治療及び排卵促進

【用法・用量】

通常 1 回 1 頭当たり酢酸フェルチレリンとして下記の量を筋肉内注射する。
100~200 μ g

【使用上の注意】

1. 一般的注意

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師の処方せん・指示により使用してください。
- (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 本剤は効能・効果において定められた適応症にのみ使用してください。

2. 使用者に対する注意

誤って人に注射した場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

3. 取扱い上の注意

- (1) 本剤は使用期限までに使用してください。
- (2) バイアル使用時には、ゴム栓をエタノール消毒綿等でよく清拭してください。
- (3) バイアルを分割使用する場合は、速やかに使用してください。
- (4) 使用済みの空容器等は適切に処分してください。

4. 保管上の注意

小児の手の届かないところに保管してください。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：酢酸フェルチレリン
Fertirelin acetate

化学名：

L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosylglycyl-L-leucyl-L-arginyl-L-proline-ethylamide acetate

分子式：C₃₅H₇₆N₁₆O₁₂ · C₂H₄O₂

化学構造式：



分子量：1213.36

性状：本品は白色の粉末である。本品は水、エタノール (99.5) 又は酢酸 (100) に溶けやすく、メタノールにはやや溶けやすい。

【包装】

コンサルタン注射液：10mL×5 (バイアル)