

## 動物用医薬品

鉄欠乏性貧血症予防剤  
動物用 **テツクール**<sup>®</sup>  
TETUCUR<sup>®</sup>貯 法：冷暗所に保管してください。  
※※使用期限：包装に表示の使用期限内に使用してください。

承認番号 15 生畜第 1694 号

本剤はデキストラン鉄とシアノコバラミン（ビタミンB<sub>12</sub>）を主成分とする筋肉内投与用注射剤で、子豚の鉄欠乏性貧血症の予防に用います。

## 【組成・性状】

販売名	動物用テツクール
成分・含量	1 mL中デキストラン鉄（鉄として）100 mg 及びシアノコバラミン 80 μg
※※ 添加物	1 mL中保存剤（フェノール）5 mg, pH調整剤
剤形・性状	バイアル（わずかに粘性がある黒褐色の水性注射液）
pH	4.2 ~ 5.2

## 【効能・効果】

子豚の鉄欠乏性貧血症の予防

## 【用法・用量】

子豚に1頭当たり鉄として下記量を1回ないし数日ごとに投与する。

なお、症状及び品種に応じて適宜増減する。

子豚：100 ~ 200mg（本剤として1 ~ 2mL）

## 【使用上の注意】

## ※※1. 一般的注意

- ※※(1) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- ※※(2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の予防・治療にのみ使用してください。
- (3) 本剤投与後、注射部位が錆色に着色することがあるので、食用として出荷の直前には投与しないでください。
- ※※(4) 本剤は獣医師の適切な指導の下で使用してください。

## ※※2. 使用者に対する注意

誤って人に注射した場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

## ※※3. 対象動物に対する注意

## ※※(1) 副作用

デキストラン鉄製剤は、子豚への投与でまれにショック・痙攣が起こるとの報告があります。

## ※※(2) 適用上の注意

- 1) 本剤は筋肉内注射のみに使用してください。
- 2) 本剤は、アルコールにより沈殿を生じるので、注射器は煮沸消毒をするか、もしくはアルコール消毒後、乾燥してから使用してください。

## 4. 取扱い上の注意

開封後速やかに使用してください。

## ※※5. 保管上の注意

- ※※(1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (2) 本剤の保管は直射日光、高温を避け、冷暗所に保存してください。

## ※※【薬理作用】

1. 子豚にデキストラン鉄を投与すると体重の増加が認められる。
2. 子豚にシアノコバラミン添加デキストラン鉄を投与すると、シアノコバラミン添加による増体重の向上の傾向が認められる。

## ※※【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：デキストラン鉄

Iron Dextran

性状：デキストランと鉄の錯体であり、黒褐色の水性液で、わずかに粘性がある。

一般名：シアノコバラミン（ビタミンB<sub>12</sub>）

Cyanocobalamin

分子式：C<sub>63</sub>H<sub>88</sub>CoN<sub>14</sub>O<sub>14</sub>P

分子量：1355.37

性状：暗赤色の結晶又は粉末である。

## 【包装】

動物用テツクール：100 mL × 1（バイアル）