

動物用医薬品

鉄欠乏性貧血症予防・治療剤

テツクール[®]200
TETUCUR[®] 200

貯法：遮光・室温で保管してください。

※使用期限：包装に表示の使用期限内に使用してください。

※ 承認番号 15生畜第1629号

※ テツクール 200 は、デキストラン鉄を主成分とする鉄分補給剤です。

【組成・性状】

販売名	テツクール 200
成分・含量	1 mL 中デキストラン鉄（鉄として）200 mg
※ 添加物	1 mL 中保存剤（フェノール）5 mg, pH調整剤
剤形・性状	バイアル（わずかに粘性がある黒褐色の水性注射液）
pH	5.0～7.0

【効能・効果】

鉄欠乏による下記の疾病の予防と治療

牛・羊・犬：貧血

豚：貧血，子豚の鉄欠乏性貧血

【用法・用量】

通常，鉄として下記の1日量を筋肉内に注射します。

牛：1頭当たり体重に応じて400～1,000 mgを連日ないし隔日に注射します。

羊：1頭当たり体重に応じて100～200 mgを注射します。

豚：子豚に1頭当たり100～200 mgを1回ないし数日ごとに注射します。

犬：体重1 kg 当たり2～10 mgを注射します。

なお，症状及び蓄種に応じて適宜増減します。

【使用上の注意】

※1. 一般的注意

※(1) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。

※(2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の予防・治療にのみ使用してください。

(3) 休薬期間：本剤投与後，注射部位が錆色に着色することがあるので，食用として出荷の直前には投与しないでください。

※(4) 本剤は獣医師の適切な指導の下で使用してください。

※2. 使用者に対する注意

誤って人に注射した場合は，直ちに医師の診察を受けてください。

※3. 対象動物に対する注意

※(1) 副作用

デキストラン鉄製剤は，子豚への投与でまれにショック・痙攣が起こるとの報告があります。

※(2) 適用上の注意

1) 本剤は筋肉内注射のみに使用してください。

※2) 本剤は，アルコールにより沈殿を生じるので，注射器は煮沸消毒をするか，もしくはアルコール消毒後，乾燥してから使用してください。

※4. 取扱い上の注意

開封後速やかに使用してください。

※5. 保管上の注意

※(1) 小児の手の届かないところに保管してください。

※(2) 本剤の保管は直射日光，高温を避けてください。

※【薬理作用】

子豚にデキストラン鉄を投与すると体重の増加が認められた。

※【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：デキストラン鉄

Iron Dextran

性状：デキストランと鉄の錯体である。

【包装】

テツクール 200：100 mL × 1（バイアル）