

定量噴霧式鼻過敏症治療剤

ミリカレット[®]点鼻液50 μ g 28噴霧用 ミリカレット[®]点鼻液50 μ g 56噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.205 に掲載される予定です。

2011年12月

製造販売元 大正薬品工業株式会社
発売元 **あすか製薬株式会社**

改訂内容（ 部改訂）

改訂後	改訂前																								
<p>【使用上の注意】</p> <p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(7) <u>全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、点鼻ステロイド剤の投与により全身性の作用（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障を含む）が発現する可能性がある。特に長期間、大量投与の場合には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められた場合には適切な処置を行うこと。</u></p> <p>4. 副作用</p> <p>(2) その他の副作用</p> <p>以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、浮腫</td></tr><tr><td>鼻腔</td><td>鼻症状（刺激感、疼痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭</td></tr><tr><td>口腔並びに呼吸器</td><td>咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>振戦、睡眠障害、頭痛</td></tr><tr><td>その他</td><td>眼圧上昇、鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。</td></tr></tbody></table> <p>注) このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	過敏症 ^{注)}	発疹、浮腫	鼻腔	鼻症状（刺激感、疼痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭	口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味	精神神経系	振戦、睡眠障害、頭痛	その他	眼圧上昇、鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。	<p>【使用上の注意】</p> <p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(7) リトナビルとの併用により全身性のステロイド作用（クッシング症候群、副腎皮質機能抑制等）が発現したとの報告があるので、併用する場合には注意すること（「相互作用」の項参照）。</p> <p>4. 副作用</p> <p>(2) その他の副作用</p> <p>以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、浮腫</td></tr><tr><td>鼻腔</td><td>鼻症状（刺激感、痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭</td></tr><tr><td>口腔並びに呼吸器</td><td>咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛</td></tr><tr><td>その他</td><td>鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。</td></tr></tbody></table> <p>注) このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	過敏症 ^{注)}	発疹、浮腫	鼻腔	鼻症状（刺激感、痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭	口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味	精神神経系	頭痛	その他	鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。
	頻度不明																								
過敏症 ^{注)}	発疹、浮腫																								
鼻腔	鼻症状（刺激感、疼痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭																								
口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味																								
精神神経系	振戦、睡眠障害、頭痛																								
その他	眼圧上昇、鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。																								
	頻度不明																								
過敏症 ^{注)}	発疹、浮腫																								
鼻腔	鼻症状（刺激感、痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭																								
口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状（刺激感、乾燥感）、不快な味																								
精神神経系	頭痛																								
その他	鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認められたとの報告がある。																								

☆「使用上の注意」等の全文は、改訂添付文書をご覧ください。

以上